

# ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата  
Бронхикум® ТП (Bronchicum® TP)

**Регистрационный номер:** ЛСР – 005678/08

**Торговое название препарата:**  
Бронхикум® ТП

**Лекарственная форма:**  
эликсир

## Состав

В 100 г эликсира содержится:

### - активные компоненты:

экстракт травы тимьяна жидкий 5,0 г;

экстракт корней первоцвета жидкий 2.5 г

### - вспомогательные компоненты:

натрия бензоат, сахарный сироп специальный\*; вода очищенная.

\* – смесь сахарозы, декстрозы (глюкозы) и фруктозы.

*Описание активного компонента:* экстракт травы тимьяна жидкий (Thymus vulgaris L.).

Соотношение травы тимьяна к экстрагенту 1:2-2,5.

Экстрагент: раствор аммиака 10% (масса/масса), глицерин 85%, спирт этиловый 90% (об/об), вода; в соотношении 1:20:70:109.

*Описание активного компонента:* экстракт корней первоцвета жидкий (Primula veris L.).

Соотношение корней первоцвета к экстрагенту 1:2-2,5.

Экстрагент: спирт этиловый 70% (масса/масса).

## Описание:

Прозрачный или слегка мутный раствор от красновато-коричневого до темно-коричневого цвета со слабо выраженным запахом тимьяна.

## Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

**Код АТХ:** R05CA10.

## Фармакологические свойства

Препарат оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, бронхолитическое, противомикробное действие, способствует снижению вязкости мокроты и ускорению ее эвакуации.

### **Показания к применению**

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей (бронхита, трахеита и др.), сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-фруктозная мальабсорбция, недостаточность ферментов сахаразы и изомальтазы, хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации), тяжелые нарушения функции печени и почек, детский возраст (до 1 года).

В связи с содержанием в препарате этилового спирта эликсир Бронхикум ТП не должен использоваться у больных алкоголизмом.

С осторожностью и только после консультации с врачом следует принимать эликсир пациентам с заболеваниями печени, заболеваниями и травмами головного мозга, эпилепсией.

### **Применение при беременности и кормлении грудью**

Препарат не рекомендуется применять при беременности и в период грудного вскармливания.

### **Способ применения и дозы**

Если врач не назначил другого режима дозирования, взрослым и подросткам назначают внутрь по 1 чайной ложке эликсира (5 мл) до 6 раз в сутки.

детям от 5 до 12 лет - по 1 чайной ложке эликсира (5 мл) до 4 раз в сутки.

детям от 1 года до 4 лет - по 1/2 чайной ложки (2,5 мл) до 3 раз в сутки.

Эликсир следует принимать через равные промежутки времени в течение суток.

Средний курс лечения составляет 10-14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

### **Побочное действие**

В редких случаях возможны следующие реакции:

*аллергические реакции*: кожная сыпь, крапивница, а также отек лица и слизистой полости рта и глотки (отек Квинке).

*со стороны желудочно-кишечного тракта*: тошнота, гастрит, диспепсия.

В этих случаях, а также в случае развития каких-либо нежелательных явлений, не указанных в инструкции, необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

### **Передозировка**

Не сообщалось о случаях развития интоксикации при приеме эликсира Бронхикум ТП.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

### **Особые указания**

Эликсир Бронхикум ТП содержит 5,46 объемных % спирта этилового.

В случае, если улучшение состояния больного не наступает, или в случае появления приступов удушья, гнойной мокроты, а также при повышении температуры следует немедленно обратиться к врачу.

Информация для больных сахарным диабетом.

5 мл эликсира (примерно 1 чайная ложка) соответствуют 0,36 ХЕ (хлебных единиц).

**Форма выпуска**

Эликсир. По 130 г препарата в стеклянный флакон с навинчивающейся пластмассовой крышкой с контролем первого вскрытия на которую надет пластмассовый стаканчик-дозатор. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению упакован в картонную пачку.

**Срок годности**

3 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения**

Хранить при температуре ниже 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Название и адрес производителя**

А. Наттерманн энд Сие. ГмбХ, Германия.

Наттерманналлее 1, Д-50829, Кёльн, Германия.

**Претензии потребителей направлять по адресу:**

115035, Москва, ул. Садовническая, дом 82, стр. 2.

Телефон: (495) 721-14-00.

Факс: (495) 721-14-11.